

Wskazówki dotyczące przyjmowania tabletek ze stabilnym jodem


OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UWAŻAJ, JEŚLI:

- stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie chorób tarczycy
- występuje u Ciebie nieleczona autonomia tarczycy
- występuje u Ciebie zaburzenie czynności nerek
- masz zaburzenia czynności nadnerczy i stosujesz leczenie z tym związane
- jesteś odwodniony
- przyjmujesz leki hamujące czynność potas, leki moczopędne oszczędzające potas, a także kaptopril, enalapril lub chinidynę

Aby uzyskać odpowiednią dawkę dla niemowląt i małych dzieci, należy przełamać tabletkę wzdułk linii podziału i podać dziecku wskazaną część tabletki.

Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. Dla dzieci karmionych piersią można rozkruszyć tabletki i rozpuścić je w wodzie, syropie lub innym płynie.



Kiedy nie przyjmować leku?

jeśli masz uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

jeśli masz nadczynność tarczycy

jeśli masz zaburzenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplementem)

jeśli choroby autoimmunologiczne połączone ze świadmem i pęcherzami na skórze (opryszczkowe zapalenie skóry Duhringa)

PAMIĘTAJ! ZWRÓĆ SIĘ O PORADĘ LEKARZA

przed przyjęciem leku
w przypadku występowania złośliwego nowotworu tarczycy lub takiego podejrzenia
w przypadku zwężenia dróg oddechowych (powodującego trudności w oddychaniu)

po przyjęciu leku
z noworodem w celu skontrolowania
czynności tarczycy

